



# HOJA INFORMATIVA

## Beneficios y Riesgos de la Vacuna COVID-19 de Pfizer

**Comprenda los riesgos y beneficios de recibir las dos dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer, que podrían prevenir que contraiga el COVID-19. Todos los mayores de 12 años pueden recibir esta vacuna. Recibir esta vacuna, es su decisión. Consulte con su proveedor de vacunas para resolver sus dudas.**

### SOBRE ESTA VACUNA

Como todas las vacunas COVID-19, esta vacuna ha sido autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), para uso de emergencia debido a la gravedad de la pandemia del COVID-19. Esta vacuna se administra en dos dosis, cada una con tres semanas de diferencia, de manera intramuscular.

#### Antes de Recibir la Vacuna

Comente con su proveedor de vacunas sobre todas sus condiciones médicas, incluyendo si:

- tiene alguna alergia
- tiene fiebre
- tiene un trastorno hemorrágico o se encuentra tomando un anticoagulante
- tiene alguna inmunodeficiencia o se encuentra tomando algún medicamento que afecte su sistema inmunológico
- está en período de gestación, lactancia o planea un embarazo
- ha recibido otra vacuna COVID-19

### RIESGOS ASOCIADOS CON ESTA VACUNA

**Efectos Secundarios Generales:** Los efectos secundarios reportados con esta vacuna incluyen reacciones alérgicas no graves (erupciones cutáneas, picazón, urticaria, hinchazón de la cara), dolor en el lugar de la inyección, hinchazón y enrojecimiento, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre, náuseas, malestar, inflamación de los ganglios linfáticos, diarrea, vómito y dolor en el brazo.

**Reacción Alérgica Grave:** Existe una remota posibilidad de que la vacuna pueda provocar una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la garganta, ritmo cardíaco acelerado, sarpullido grave en todo el cuerpo, mareos, debilidad), que por lo general ocurriría minutos o hasta una hora después de recibir la dosis.

### BENEFICIOS DE LA VACUNA

En un ensayo clínico en curso, se ha demostrado que esta vacuna previene la enfermedad, la hospitalización o la muerte por COVID-19, después de las dos dosis administradas con tres semanas de diferencia. Actualmente se desconoce la duración de la protección contra el COVID-19.

### SI USTED EXPERIMENTA EFECTOS SECUNDARIOS

Si usted experimenta alguna reacción alérgica grave, llame al 9-1-1, o diríjase al hospital más cercano. Llame a su proveedor de vacunas o a su médico si los efectos secundarios resultan persistentes o inesperados.

### NO DEBERÍA RECIBIR LA VACUNA SI:

Ha experimentado reacciones alérgicas graves a cualquier componente de esta vacuna: ARNm, lípidos ((4-hidroxitil) azanediil) bis (hexano-6,1-diil) bis(2-hexildecanoato), 2 [(polietilenglicol)-2000]-N, N-ditetradecilacetamida, 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfolina y colesterol), cloruro de potasio, fosfato monobásico de potasio, cloruro de sodio, fosfato dibásico de sodio dihidrato y sacarosa.

### OTRAS OPCIONES PARA PREVENIR AL COVID-19

Es su decisión recibir esta vacuna y no obtenerla no cambiará su atención médica estándar. Otras vacunas para prevenir el COVID-19 están disponibles.

**Para Más Información:**

**VISITE**  
[pfizer.com/science/coronavirus/vaccine-efforts](https://pfizer.com/science/coronavirus/vaccine-efforts)  
o [cdc.gov/coronavirus](https://cdc.gov/coronavirus)

**LLAME AL**  
1-866-663-3762  
1-800-401-0946